

190. NECYDALIS. *Antennæ fetaceæ.*
Elytra dimidiata. Alæ nudæ.
Cauda simplex.

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Schæff. monogr. 1753. f. 1, 2. Musca-Cerambyx major.
Habitat in Europa.

minor. 2. N. elytris testaceis: apice lineola alba, antennis corpore longioribus.

Fn. svec. 697. Necydalis elytris flavis lineola alba.

It. æl. 74.

Schæff. monogr. 1753. f. 6, 7. Musca Cerambyx minor.
Habitat in Europa.

191. STAPHYLINUS. *Antennæ moniliformes.*
Elytra dimidiata. Alæ rectæ.
Cauda simplex exserens duas
vesiculas oblongas.

hirtus. 1. S. hirsutus niger, thorace abdomineque postice flavis.

Fn. svec. 601.

Schæff. monogr. 1754. t. 2. f. 12.

Habitat in locis arenosis.

murinus. 2. S. pubescens cinereus nigro-nebulosus. *Fn. svec. 602.*

Habitat in fimo equino.

maxillo- 3. S. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine
 fus. capitis.

Fn. svec. 603. Staphylinus ater glaber, maxillis longitudine capitis.

Raj. inf. 109. n. 1. Staphylinus major totus niger.

List. loqu. 391. Scarabæus majusculus niger forcipibus infestis.

Mouff. inf. 197. Fonst. inf. t. 17. f. 1. 2. 3.

Habitat in sylvis Europæ.

Junior undique tomentosus per elytra & abdomen, cum fascia cinerea elytrorum & abdominis; provector glaber & totus ater evadit.