

sur la zone médiane un sillon longitudinal de chaque côté de sa partie médiane, entre les plis transversaux, et par son prosternum comme bilobé à son extrémité, au lieu d'être relevé en pointe obtuse.

Elle s'éloigne de l'*Hammaticherus Welensii*, KÜSTER, par son corps sans pubescence apparente en dessus; par son prothorax creusé de deux sillons longitudinaux sur zone médiane; par ses élytres rétrécies d'avant en arrière, ni arrondies chacune à l'extrémité, ni acuminées à la suture, noires à la base; et enfin par sa taille.

Elle diffère enfin de l'*Hamm. carinatus*, KÜSTER, par son corps non pubescent en dessus, par ses élytres non acuminées à la suture, plus fortement rugueuses, etc.

Callimus egregius.

Capite, pectore tibiisque posticis, nigris; pronoto, femoribus, tibiis anticis et intermediis ventreque rufo-flavis; elytris violaceis.

Long. 0,0078 (3 l. 1/2); larg. 0,0015 (2/3 l.).

♂ Corps allongé; planiscule.

Tête noire; luisante; presque lisse; hérissée de poils cendrés longs et peu épais; rayée entre les antennes d'un court sillon longitudinal.

Labre roussâtre.

Antennes à 3^e article moins long que le 1^{er}, à peine aussi long que le 4^e: le 5^e le plus long: le 1^{er} noir: les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e, d'un roux fauve à la base, noirs en dessus dans leur seconde moitié: les six derniers bruns ou d'un brun roussâtre: les quatre premiers hérissés de poils en dessus, et surtout à leur extrémité: les deux suivants seulement à l'extrémité: les autres, glabres.

Prothorax un peu plus long sur sa ligne médiane que large à sa base; tronqué et rebordé en devant et à la base; anguleusement dilaté dans le milieu de ses côtés; lisse, luisant, mais marqué de points, constituant un cercle, prolongé depuis les deux cinquièmes de sa longueur jusqu'au rebord basilaire, couvrant un peu plus du tiers

médiane de sa largeur; subtuberculeux sur la partie enclose dans ce cercle; hérissé de longs poils d'un cendré livide; d'un roux flave; avec les rebords antérieurs et basilaires noirs.

Écusson presque en demi-cercle; noir, revêtu de poils d'un brun cendré.

Elytres débordant la base du prothorax du tiers de la largeur de chacune; deux fois et demie à deux fois et trois quarts aussi longues que lui; subparallèles ou plutôt un peu en courbe rentrante à leur côté externe jusqu'au cinq sixièmes de leur longueur, arrondies chacun à l'extrémité; déhiscentes à la suture, presque depuis l'écusson; débordées par le pygidium; d'un violet métallique; rugueusement ponctuées; garnies de poils cendrés ou livides, moins allongés que ceux du prothorax, mi-couchés. Pygidium d'un roux flave, terminé en ogive; garni de poils noirs et obscurs.

Dessous du corps hérissé de poils cendrés; noir sur les parties pectorales; d'un roux flave, luisant et presque imponctué sur le ventre.

Pieds hérissés de poils livides et d'un cendré livide: cuisses en massue, d'un roux flave: quatre tibias antérieurs de même couleur, avec l'extrémité obscure: tibias postérieurs noirs: tarsi postérieurs noirs: les autres, en partie obscurs, en partie d'un roux flave ou d'un roux fauve.

PATRIE: La Caramanie (collection Reiche).

OBS. Nous n'avons vu que le ♂. La ♀ offre sans doute aussi le 2^e anneau du ventre conformé comme chez les deux autres espèces connues de ce genre.

Dorcadion Blanchardi.

Nigrum, pedibus rubro-testaceis, pubescentibus; capite posticè lineis duabus albo-tomentosis; pronoto nudo, rugoso profundè punctato; elytris oblongo-ovatis, fossulâ et carinâ humeralibus abbreviatis, nigro-tomentosis, suturâ, margine laterali, apicali breviter, lineâ humerali usque ad apicem prolongatâ, maculâque basali albis.