

1042. *CLYTUS COMPTUS*, Ziegl. — Mannerh. Humm. Essais Entomogr. N° 4, pag. 36.

Var. *major*, *pedibus rufis*, *femoribus brunneis*.

Je l'ai pris à Lenkoran et sur l'île Sara.

1043. *CLYTUS FLORALIS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 346, N° 3.

Var. *B. fasciis nigris majis distinctis*.

Var. *C. fasciis elytrorum thoraceque citrinis*.

Il est très commun sur les montagnes de Talyche.

1044. *CLYTUS ZEBRA*, Dalm. Schoenh. Syn. Ins. III, p. 461, 6.

Il est très commun ainsi que la variété *a* de cet auteur.

Sur les montagnes de Talyche.

1045. *CLYTUS ORNATUS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 351, N° 26.

Je l'ai pris sur l'île Sara.

1046. *CLYTUS DETRITUS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 350, N° 21.

Il se trouve à Zouvant.

1047. *CLYTUS ANTILOPE*, Illig. Schoenh. Syn. Ins. III, p. 465, 14.

Sur les fleurs au pied du Caucase.

1048. *CLYTUS ARIETIS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 347, p. 9.

Se trouve à Lenkoran.

1049. *CLYTUS RHAMNI*, Germ. Reise in Dalmat. p. 223, Tab. IX, fig. 5.

Je l'ai pris à Lenkoran.

1050. *CLYTUS GAZELLA*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 347, N° 10.

Il est assez rare sur les montagnes de Talyche.

1051. *CLYTUS LUGUBRIS*, mihi.

Tomentoso-aterrimus; thorace subgloboso, medio latiore nonnunquam lunula utrinque scutelloque albis; elytris utrinque basi punctis quatuor, lunula media punctisque tribus apice, albis; tarsi antennisque apice rufis.

Long. 5 li. $\frac{1}{2}$ - 7 li. Larg. 1 li. $\frac{3}{4}$ - 2 li. $\frac{1}{4}$.

La lunule de chaque côté du corselet est quelquefois peu visible, les

quatre points de la base des élytres sont ainsi disposés: l'un touchant la suture, deux autres un peu plus bas placés sur la même ligne, enfin le dernier près de l'angle externe; on remarque de plus le long du bord externe, un trait blanc caché dans le sillon de l'élytre; la lunule est située un peu plus bas que la moitié inférieure de l'élytre, et traverse celle-ci entièrement; les trois premiers anneaux de l'abdomen sont marqués de blanc, ainsi que la poitrine.

Il paraît rare sur les montagnes de Talyche.

1052. *CLYTUS PLEBEIUS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 349, N° 15.

Se trouve à Lenkoran.

1053. *CLYTUS MASSILENSIS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 351, N° 26.

Moins commun que le précédent.

1054. *STENOPTERUS RUFUS*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 372, N° 22.

Commun à Lenkoran.

1055. *CERTALLUM RUFICOLLE*, Meg. Fabr. Syst. Eleut. II, p. 334, N° 4.

Il était très commun à Bakou, au mois d'Avril.

1056. *RHAGIUM INQUISITOR*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 313, N° 2.

Dans les bois près de Lenkoran.

1057. *PACHYTA VARIABILIS?* Gebl. Mem. des Natur. de Moscou T. V, p. 320.

Var. *nigra*, *humeris obscure rufis*.

Au Caucase.

1058. *PACHYTA ALPINA*, mihi.

Brevior, nigra, parce griseo-pilosa; thorace medio impresso; elytris maris postice attenuatis, feminae sublinearibus, apice rotundatis.

Long. 4 - 4 li. $\frac{1}{2}$. Larg. 1 - 1 li. $\frac{1}{2}$.

Elle ressemble beaucoup à la *P. marginata*, mais le bord des élytres est de la même couleur que tout le reste de l'insecte.

Je l'ai prise sur les Alpes du Caucase, à huit mille pieds d'élévation.