

scurè viridi-auratâ : pro- et mesofemora rufa, metafemora basi rufa ; pedum cætera nigra. (Corp. long. 1·2 unc. lat. ·2 unc.)

7. *Callichroma accensum*. Antennæ corpore ferè duplo longiores, graciles, articulis canaliculatis nigro-chalybeis : caput roseo-æneum : prothorax rugatus roseo-æneus, maculâ dorsali elongatâ geminatâ nigricanti : elytra obscura roseo-ænea, lateribus suturâque nigricantibus, prope suturam nitentia : scutellum asperum nigro-roseum : femora rufa, tibiis tarsisque rufo-piceis. (Corp. long. 1·2 unc. lat. ·225 unc.)
8. *Callichroma rugatum*. Antennæ corpore valdè longiores, nigro-chalybei ; caput nigro-viride : prothorax pulcherrimè rugatus, rugis trifariam dispositis, nigrovirens : elytra obscura, nigro-virentia ; suturâ cum scutello nigricantibus : pedes chalybei. (Corp. long. 1·1 unc. lat. ·225 unc.)
9. *Callichroma semignitum*. Chevrolat.  
Annon *Cerambyx albitarsus*? Fabricius Syst. Eleu. ii. 267 valdè affinis!
10. *Polyzonus bifasciatus*. Caput, prothorax et scutellum nigro-ænea ; antennæ nigræ, 11-articulatæ, corpore vix longiores, apice crassiores : prothorax ferè cylindraceus, punctus : elytra obsoletè bicarinata, obscura, nigro-chalybea, fasciis 2 communibus luteis, primâ ante, 2dâ pone medium : pedes nigri, fulgore metallico nitidi. (Corp. long. ·7 unc. lat. ·1 unc.)
11. *Xystrocera globosa*. Cerambyx globosus, Oliv. tom. iv. Cap. p. 27, tab. xii., fig. 81.
12. *Arhopalus longicornis*. Cano-fuscum, lanuginosum, punctum ; antennæ graciles, maris corpore valdè longiores, feminæ breviores, articuli basi pallidi, apice nigri, subtùs hirsuti : prothorax dorso tuberibus 5 obsoletis instructus, punctis nonnullis magnis impressus : elytra punctis haùd profundis, pustulisque nonnullis vix lineatim dispositis signata : pedes fusci femoribus basi pallidis. (Corp. long. 1 unc. lat. ·275 unc.)
13. *Arhopalus ambiguus*. Pallidè fuscum, undiquè punctum, pilis cinereis undiquè obsitum : antennæ corpore haùd longiores : scutellum tomentosum : pedes breves, femoribus tumescentibus. (Corp. long. ·6 unc. lat. ·15 unc.)
14. *Clytus annularis*. Fabricius Syst. Eleu. ii. 352.
15. *Clytus Protogenes*. Antennæ fusco-testaceæ : prothorax flavescent, maculâ pone capitem subtrigonâ fasciâque transversâ medianâ latâ recurvâ nigris : elytra flavescentia, maculâ utriusque basin versus lunatâ recurvâ, fasciâ medianâ communi scutellum versus apicatâ, maculâque utriusque antè apicem difformi nigris ; apice truncata, angulo externo acutè 1-dentato : pedes fusco-testacei, metafemoribus elytris valdè longioribus apice nigricantibus. (Corp. long. ·6 unc. lat. ·1125 unc.)
16. *Clytus Phidias*. Caput, antennæ, prothorax et pedes nigricantia, pilis albidis obsita : elytra picea, vittâ utriusque medianâ latâ nigrâ, lineis utriusque 3 lanuginosis albidis, 1mâ literam C. assimili marginem costalem spectanti, 2dâ pone medium obliquâ, 3tiâ abbreviatâ subapicali. (Corp. long. ·55 unc. lat. ·1125 unc.)
17. *Clytus incanus*. Niger, elytris cinereo signatis, utriusque lineâ basali, ferè circulare, maculâ inclusâ nigrâ, fasciâ latâ medianâ communi alterâ apicali cinereis. (Corp. long. ·4 unc. lat. ·1 unc.)
18. *Clytus pudicus*. Niger, lineâ utriusque elytri basin versus obliquâ, fasciâque rectâ communi medianâ niveis, apice lanuginosâ canâ rotundatâ. (Corp. long. ·4 unc. lat. ·1 unc.)