

30. CAPRICORNE globuleux.

CERAMBIX globosus. Pl. 12. fig. 81.

C. roussâtre, corcelet globuleux, bronzé, bord extérieur et une ligne moyenne sur les élytres, bronzés.

C. rufescens, thorace globoso inermiti, æneo; margine, lineaque media elytrorum fusco-æneis.

C. eleganti affinis et fortè ejus varietas. Rufescens. Antennæ nigro-rufescentes scabræ. Thorax rotundatus, muticus, scaber marginibus fusco-æneis. Elytra pallidiora, margine exteriori, apice lineaque media fusco-viridi-æneis. Femora incrassata suprâ rufa, subtùs fusca.

Il ressemble beaucoup au Capricorne élégant. Les antennes sont raboteuses et d'un brun roussâtre; leurs articles sont allongés. Le corcelet est arrondi, chagriné, sans épines latérales. Il est bordé d'une auréole bronzée; le milieu est roussâtre. Les élytres sont d'un roux jaunâtre, moins foncé. Leur bord extérieur, leur extrémité et une ligne longitudinale moyenne sont d'un brun verdâtre bronzé. Les cuisses sont renflées, brunes en dessous, roussâtres en dessus.

Il se trouve aux environs de Batavia.

31. CAPRICORNE strié.

CERAMBIX striatus. Pl. 5. fig. 31. et Pl. 10. fig. 71. a. b.

C. ferrugineux, à corcelet épineux et tuberculé, élytres avec des stries jaunes.

C. thorace bispinoso rugoso, ferrugineus, elytris flavo striatis, antennis longis. FAB. Mant. ins. tom. 1. pag. 133. n^o. 28. — Ent. Syst. emend. pars. 2. pag. 259. n^o. 28.

Statura et magnitudo omninò *C.* succincti. Antennæ cylindricæ, corpore duplò longiores, ferrugineæ, apice nigræ. Caput ferrugineum punctis tribus verticalibus nigris. Thorax inæqualis sive rugosus utrinque spinis duabus, ferè æqualibus, ferrugineus, nigro punctatus. Scutellum triangulum apice nigrum. Elytra lævia, glabra, ferruginea striis quatuor flavis, quæ apicem haud attingunt et quarta suturali abbreviata. Femora apice nigra. FAB.

Il ressemble entièrement, pour la forme et la grandeur, au Capricorne cordonné. Les antennes sont ferrugineuses, plus longues que