

## **Purpuricenus** Fischer

*Pur. budensis* Gœze. — Noir, élytres d'un rouge vermillon passant au jaunâtre par décoloration, ayant une bande noire partant, sur la suture, du milieu des élytres et étendue en s'élargissant à l'extrémité avec le prothorax bordé antérieurement de rouge, ou orné de deux taches sur les côtés, et plus souvent encore tout noir; l'*affinis* Brul. se rapporterait à cette dernière coloration prothoracique. En Asie mineure, on trouve une race (v.) *humeralis* ayant aux épaules une bande noire étroite; le corselet chez cette v. paraît plus large que chez la forme typique sans bande noire humérale et offre, en avant, ordinairement une large tache rouge.

*P. Kæhleri* L. — Elytres d'un rouge vermillon avec, ou sans, tache noire n'atteignant pas l'extrémité. Prothorax noir ou taché diversement de rouge.

**A.** — Forme assez large, prothorax non étroit, à côtés épineux.

Une tache noire suturale sur le milieu des élytres, plus ou moins étendue et n'atteignant pas l'écusson. Type *Kæhleri* L.

Tache noire très longue, atteignant l'écusson et couvrant largement les élytres. (V.) *A. cinctus* Villa.

Tache noire très étendue couvrant presque la totalité des élytres, dessus du corps un peu plan. (V.) *B. aetnensis* Bassi.

Tache suturale très diminuée, ne laissant sur chaque élytre, près de la suture, qu'une petite ligne ou un point noir.

(V.) *C. bilineatus* Muls., *bipunctatus* Villa.

Tache nulle, d'où les élytres entièrement rouges, quelquefois un peu jaunâtres. (V.) *D. ruber* ou *Servillei* Serv.

**A'.** — Forme étroite, prothorax à côtés indistinctement tuberculés. Tache noire élytrale partant de l'écusson et prolongée presque jusqu'à l'extrémité.

V. *globulicollis* Muls.

Le *Pur. barbarus* Luc. présente chez le ♂ le prothorax tout noir ou orné de deux points rouges, chez la ♀ tout rouge dans sa partie médiane. La ♀ offre les élytres rouges avec un peu de noir aux épaules et une tache de même teinte à l'extrémité, ne remontant pas, un peu diminuée sur la suture, jusqu'à la moitié des élytres; ♂ à élytres tantôt triangulairement rouges de chaque côté et quelquefois avec une petite trainée rouge près de l'écusson sur la suture (type), tantôt presque entièrement noirs, ne laissant qu'un petit rebord externe rouge (v.) (*A. limbatus*); une autre (v.) (*B. interruptus*) offre à