

Il manque dans le présent synopsis *A. bicallosus* Kr (1) que je ne connais pas en nature, cette espèce, originaire de Samarkand, serait d'après l'auteur voisine *de mysticus*, en voici la diagnose :

« Cl. mystico persimilis, capite thoraceque subrufis, elytris humeris brunneis, maculis 2 nigro tomentosus basalibus, intra medium et basin striga undulata alia pone medium nigris apiceque late albido pubescenti. L. 14 m. »

Il existe encore, en Mongolie et au Japon, plusieurs autres espèces de ce genre, je me contente de les citer : *Kaussuensis* Gglb. (Hor. Ross. 90, p. 71), de Mongolie ; *subfasciatus* Pic (Mat Long. VI, 1, 1906 p. 17), du Japon et *nipponensis* Bates (Lond. 1884, p. 234), également du Japon.

Je termine cette modeste étude en donnant la diagnose d'une nouveauté que je dois au voyageur naturaliste Rost et provenant de Iesso, au Japon.

Anaglyptus Rosti n. sp. — Allongé, subparallèle, entièrement noir à l'exception des tarsi et de l'extrême sommet des antennes qui sont roussâtres, assez densément pubescent de gris surtout sur le dessous avec les élytres ornés de bandes d'un gris jaunâtre. Antennes à 3^e article seul denté au sommet ; élytres à gibbosités basales faiblement indiquées, assez fortement impressionnés vers les épaules, subtronqués en oblique au sommet, sans angles saillants, largement pubescents au sommet et ornés, en outre, d'une large fascie médiane remontant en avant sur la suture et d'une étroite et longue fascie antérieure partant des côtés et remontant jusqu'à l'écusson. Long. 9 m.

Ressemble beaucoup à *Reitteri* Gglb, mais les élytres sont fasciés, et non maculés, de jaune, tandis que les antennes sont assez grêles et presque toutes noires.

LEPTURA (SPHENARIA) REVESTITA L. ET SES VARIÉTÉS

La *Leptura (Sphenaria) revestita* L. est assez répandue en France, sans être commune ; comme elle est très variable, une étude spéciale sur

(1) Probablement un *Cyrtophorus* d'après Ganglbauer (*Hor. Rossicae*, XXIV, p. 72, note).