

les tibias avec une forte dent au milieu, courbés en dedans et fortement mucronés au bout.

Cette espèce a été prise à Yarbasch, sur l'Akh-Daria, au commencement de Mai.

Longicornes.

Pachydissus Sartus n. sp.

Tab. V, fig. 4.

Elongatus, parallelus, subcylindricus, parum nitidus, nigro-fuscus, pube brevi cinerea sericeus; thorace inermi, plicato, dorso longitudinaliter biimpresso, medio tenue subcanaliculato; elytris apice truncatis subbispinosis, subtiliter disperse punctatis, pube densiore fuliginosa cinereo maculatim micante indutis. Long. 43 mlm. ¹⁾.

Allongé, parallèle, subcylindrique, d'un noir (ou brun foncé) fuligineux, médiocrement luisant, revêtu d'une courte pubescence cendrée, soyeuse, luisante, subrelevée. Tête sillonnée entre les yeux et les tubercules antennifères qui sont déprimés, faisant saillie en arrière en forme de lobes arrondis; front vertical, muni d'une plaque transversalement ovale, très distincte, limitée surtout sur les côtés d'un sillon profond et située un peu en avant des antennes; le reste de la surface irrégulièrement rugueuse. Les joues presque aussi longues que chez le *Cerambyx cerdo* L. (*heros* Scop); les mandibules longitudinalement rugueuses et pubescentes, moins le tiers apical qui est glabre et luisant, noires, médiocres, verticales, faiblement carénées en dessus. Les yeux fortement granuleux, leur lobe inférieur ne dépassant pas en avant les tubercules antennifères, l'intervalle qui les sépare en dessus de 1¹/₂ mlm. Antennes du

¹⁾ Dimensions: long. les élytres 26, le corselet 8; larg. aux épaules 11, corselet 9, tête 7 mlm.

mâle très-finement pubescentes, beaucoup plus longues que le corps à article premier médiocre, en cône un peu arqué (long. $4\frac{1}{4}$ mlm.), deuxième très court (1 mlm.), troisième un peu plus long que le premier (5 mlm.) et égal au cinquième, qui est seulement notablement plus mince, le quatrième plus court que les deux voisins, de la longueur du premier, le sixième de $8\frac{1}{2}$ mlm., 7—10 égaux de 9 mlm., le dernier plus de deux fois plus long que le précédent (21 mlm.); articles 3—5 plus épais que 6, noueux au bout ainsi que 6 et 7. Le corselet inerme, un peu plus large que long, avec le bord postérieur bisinué, l'antérieur s'avancant un peu en angle au milieu; avec un sillon transversal et un étranglement avant la base et le sommet, plissé transversalement sur les étranglements antérieur et postérieur, tortueusement plissé sur le reste de la surface, un peu déprimé sur le dos, subanguleusement arrondi sur les côtés au milieu de la longueur, avec une fine ligne enfoncée longitudinale, peu apparente, au milieu entre les deux impressions transversales, et une impression longitudinale arquée en dehors plus large et bien distincte de chaque côté du sillon médian (la plus grande distance entre ces sillons latéraux, se trouvant près de la base, est de $2\frac{3}{4}$ mlm.). Ecusson en triangle curvilinéaire, presque sémicirculaire. Elytres assez courtes, ne couvrant pas tout à fait l'abdomen, carrément coupées à la base, avec les épaules saillantes, faiblement convexes, avec une impression courte, mais profonde de chaque côté à la base, en dedans du calus, tronquées un peu obliquement vers la suture et faiblement bidentées à l'extrémité, parallèles, même subcomprimées latéralement au milieu de la longueur; leur surface présente des traces à peine distinctes de trois nervures, dont la médiane commençant un peu en dedans du calus huméral et plus distincte et se laisse poursuivre jusque près de l'extrémité; elle est parsemée de points fins, écartés, disparaissant sur la moitié postérieure et recouverte d'une pubescence serrée, tomenteuse, d'un cendré fuligineux, chatoyante en taches cen-

drées blanchâtres, irrégulières et changeantes selon la direction dans laquelle tombe la lumière. Pattes longues, comprimées; cuisses linéaires, les postérieures un peu plus courtes que les élytres, avec une brosse de duvet court, serré, d'un roux ferrugineux sur le milieu de l'arête antérieure de ces organes, occupant à peu près le tiers médian de la longueur; les tarse postérieurs à premier article presque aussi long que deux et trois ensemble; les tibias vers l'extrémité, sur la partie inférieure, et les tarse sur les bords couverts d'une pubescence ferrugineuse serrée. Saillie mésosternale large, échancrée au bout, saillie prosternale coupée verticalement en arrière.

Seulement des ♂, trouvés à Samarkand dans du bois de peuplier, dans les ateliers.

Cette espèce ressemble par sa coloration et sa sculpture au *P. holosericeus* Fabr. de l'Archipel Indien et de la Chine, mais elle est plus grande et les proportions des parties du corps sont différentes. Les élytres sont beaucoup plus grandes, plus larges et surtout plus longues en comparaison avec la partie antérieure du corps; le corselet est plus allongé, plus atténué en avant, plus anguleux sur les côtés; la tête beaucoup plus petite, moins large que le corselet. Les premiers articles des antennes sont moins noueux et moins épais en comparaison avec les autres, que chez l'espèce indienne.

Staphylinides ¹⁾.

Falagria thoracica Grav. et *gratilla* Er. Djisak — Janvier; Samarkand — Mars.

¹⁾ Plusieurs espèces de cette famille, qui ont été recueillies par Mr. Fedtschenko durant sa première excursion dans la vallée de Zaravschan, ne sont pas rentrées dans cette énumération à cause de leur état de conservation, qui rend leur étude impossible. Suivant l'ancienne méthode, heureusement plus et plus abandonnée aujourd'hui, Mr. Fedtschenko a piqué toute sa récolte, sans en excepter les plus petites espèces comme *Falagria gratilla*, des petits *Stenus* et autres. Il n'est resté de la sorte d'un assez grand nombre qu'une moitié du corps sur les épingles, plusieurs autres quoiqu'entières, mais attachées sur le